

【治癒証明書が必要な感染症】

鳴島中央認定こども園

| 病名 | 病原体 | 潜伏期 | 伝播様式 | 感染可能期 | 主な症状 | 出席停止期間 |
|---------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 百日咳 | 百日咳菌 | 7～10日 | 飛沫感染 | 感染後約3週間 | 発作性咳その長期反復持続 | 特有の咳が消失するまで |
| はしか | 麻疹ウイルス | 10～12日 | 飛沫感染 | 発疹出現の前後4～5日 | 発熱・上気道のカタル・粘膜疹コプリック斑・発疹 | 解熱後3日を経過するまで |
| おたふくかぜ (流行性耳下腺炎) | ムンプスウイルス | 15～21日 | 飛沫感染 | 明らかな症状を示す7日前からその後9日間 | 発熱・耳下腺・舌下腺・顎下腺の腫張及び圧痛 | 耳下腺の腫張が消失するまで |
| 風疹 | 風疹ウイルス | 14～21日 | 飛沫感染 | 発疹出現の前後7日間 | 種々の発疹・軽熱・リンパ節の腫張 | 発疹が消失するまで |
| 水ぼうそう | 水痘ウイルス | 14～21日 | 飛沫感染及び接触感染 | 水痘発現前2日～後6日 | 軽熱や高熱・発疹・斑点丘疹状～水泡～顆粒痂皮 | すべての発疹が痂皮するまで |
| プール熱 (咽頭結膜熱) | アデノウイルス | 3～9日 | 飛沫感染及び経口感染 | 潜伏期の後半から5日間 | 発熱・咽頭炎と結膜炎の合併症 | 主要症状を消退した後2日を経過するまで |
| 流行性角結膜炎 | アデノウイルス | 5～7日 | 接触感染 | 発病後約2週間 | 軽熱・頭痛・全身倦怠・結膜炎の炎症・眼瞼浮腫・目やに | 主要症状が消退するまで |
| 感染性胃腸炎 | ノロウイルス ロタウイルス アデノウイルス | 1～2日 1～3日 7～8日 | 経口感染 接触感染 | ウイルスは吐物に大量に含まれ、便には2～4週含まれる | 発熱・腹痛・嘔吐・下痢 (白色便下痢症はロタウイルス) | 嘔吐、下痢が治まり、いつもの食事が食べられてから |

なお以下の感染症については、治癒証明書は不要ですが、かかりつけ医師の診断に従い認定こども園での集団生活に適應できる状態に回復してから登園するよう、ご配慮下さい。

***なおインフルエンザと新型コロナウイルス感染症につきましては、出席停止期間を必ずお守りください。**

| 病名 | 病原体 | 潜伏期 | 伝播様式 | 感染可能期 | 主な症状 | 出席停止期間 |
|------------------|-------------|-------|--------------|----------------------|-----------------------------|--|
| インフルエンザ | インフルエンザウイルス | 1～3日 | 飛沫感染 | 感染後約10日 | 乳幼児では発熱・不機嫌・食欲不振ときに嘔吐・下痢・鼻血 | 発症後5日を経過し、解熱後3日を経過するまで (発症日は0日とする) |
| 新型コロナ ウイルス感染症 | コロナウイルス | 1～14日 | 飛沫感染 接触感染 | 発症日2日前～ 発症後10日間程度 | 発熱・鼻水・咳・のどの痛み 味覚・嗅覚異常など | 発症後5日を経過するまで かつ、症状が軽快した後1日 経過するまで (発症日は0日とする) |

| | | | | |
|-----------|-----------------|-----------|------|-------------|
| 溶連菌感染症 | ヘルパンギーナ | マイコプラズマ肺炎 | 手足口病 | 伝染性紅斑(りんご病) |
| RSウイルス感染症 | ヒトメタニューモウイルス感染症 | とびひ | 水いぼ | アタマジラミ |